

Aandachtspunten bij de behandeling van schurft met Permetrine (Loxazol) 50mg/g crème 30 mg.

- Niet douchen vlak voor het insmeren. Er moet minimaal een uur tussen zitten.
- Neem de tijd voor het insmeren en houd een vaste volgorde aan.
- Gebruik tijdens de behandeling geen schoonheidsproducten (zoals make-up) en crèmes (zoals bodylotion).
- Laat iemand anders je rug insmeren. Als deze persoon niet ook behandeld moet worden, moet dit met wegwerphandschoenen gebeuren.
- Gebruik de hele tube voor 1 behandeling, laat er een klein beetje in achter voor opnieuw insmeren na handen wassen en toiletbezoek.
- Personen met een brede lichaamsbouw hebben meer dan 1 tube van 30 mg nodig per behandeling.
- Welke plekken moeten ingesmeerd worden?
 - Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: van de kaakrand tot onder de voetzolen. Ook de handpalmen insmeren.
 - Kinderen tot en met 12 jaar: hele lichaam, dus inclusief gezicht, nek, hoofdhuid en oren. Smeer niet in de ogen en mond.
- Besteed extra aandacht aan enkels, de ruimtes tussen de tenen en het onderste deel van de rug en het stuitje.
- Laat de crème 12 uur intrekken en douche daarna.
- Gebruik voor een volwassene de volgende hoeveelheid crème per lichaamsdeel.
FTU: de hoeveelheid zalf die past op de lengte van het eindkootje van een vinger.
 - hoofd en hals: 2,5 FTU
 - 1 arm en hand: 4 FTU
 - 1 been en voet: 8 FTU
 - romp (voorkant): 7 FTU
 - rug en billen: 7 FTU
- Volg ook het RIVM-stappenplan met extra hygiënemaatregelen.

